План лекции

1. Квантовый гармонический осциллятор
2. Квантово-механическая задача о квантовом осцилляторе
3. Уровни энергии осциллятора. Примеры решения задач о квантовом осцилляторе.

Нуркенов Серик Амангельдинович

Квантовый гармонический осциллятор

Гармоническим осциллятором называют частицу, совершающую одномерное движение под действием квазиупругой силы $F = -kx$.

Потенциальная энергия частицы

$$U(x) = \frac{kx^2}{2} \text{ или } U(x) = \frac{m\omega^2 x^2}{2}, \text{ где } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Движение частицы при наличии квазиупругих сил рассматривается в квантовой механике как нахождение частицы в параболической яме

Квантовый гармонический осциллятор

График потенциальной энергии частицы:

В точках с координатами $-x_0$ и $+x_0$, полная энергия равна потенциальной энергии. Поэтому **с классической точки зрения частица не может выйти за пределы области $-x_0$ и $+x_0$**

Особенность волновой функции, **описывающей квантовый гармонический осциллятор, заключается в том, что она за пределами ямы отлична от нуля**. Другими словами, квантовый гармонический осциллятор может оказаться за пределами интервала $\pm x_0$, т.е. за стенками квадратичной потенциальной ямы, чего классический осциллятор не может.

Квантово-механическая задача о квантовом осцилляторе

Гармонический осциллятор в квантовой механике - **квантовый осциллятор** - описывается уравнением Шредингера:

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right) \Psi = 0$$

Значения **полной энергии** осциллятора

$$E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$

Волновые функции в координатном представлении первых восьми состояний

Область недоступная для классической частицы

$$E_{\min} = E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

Уровни энергии осциллятора. Примеры решения задач о квантовом осцилляторе.

При $n = 0$, получаем значение энергии: $E_0 = \frac{\hbar\omega_0}{2}$

это так называемая энергия нулевых колебаний, минимальная энергия квантового гармонического осциллятора.

Это явление — нулевые колебания — противоречит классической картине, в которой минимальная энергия равна нулю, что подразумевает отсутствие движения.

В потенциальной яме уровни энергии могут принимать только дискретные значения.

Уровни энергии осциллятора. Примеры решения задач о квантовом осцилляторе.

При $n=1$: Классический гармонический осциллятор плохо предсказывает результаты квантового осциллятора и, следовательно, реальность. В классической модели частица будет проводить большую часть времени на краях (где кинетическая энергия равна нулю, а потенциальная энергия максимальна). Однако квантовая модель утверждает противоположное: частица с большей вероятностью будет находиться в центре.

При $n=50$: Квантовая модель начинает совпадать с классической, и частица, скорее всего, будет находиться у краёв. Такое совпадение квантовой и классической моделей на высоких квантовых уровнях называется принципом соответствия.

Уровни энергии осциллятора. Примеры решения задач о квантовом осцилляторе.

Волновые функции гармонического осциллятора

$$\Psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{x_0 \sqrt{\pi}}} \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)$$

$$\Psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2x_0 \sqrt{\pi}}} \cdot \frac{2x}{x_0} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)$$

$$\Psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{8x_0 \sqrt{\pi}}} \cdot \left(\frac{4x^2}{x_0^2} - 2\right) \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)$$

Уровни энергии осциллятора. Примеры решения задач о квантовом осцилляторе.

Задача 1. Принимая, что волновая функция $\psi(x) = A x e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2}$ удовлетворяет стационарному уравнению Шредингера для гармонического осциллятора, масса которого m и постоянная квазиупругой силы k , определите собственное значение полной энергии осциллятора.

Решение: Для решения этой задачи мы будем использовать стационарное уравнение Шредингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

где $U(x) = \frac{kx^2}{2}$

Дана волновая функция

$$\psi(x) = A x e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2}$$

Для начала нужно найти первую производную:

$$\frac{d\psi}{dx} = \left(A x e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2} \right)' = A e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2} \left(1 - \frac{\sqrt{mk}}{\hbar} x^2 \right)$$

Теперь находим второе производное:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \left(A e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2} \left(1 - \frac{\sqrt{mk}}{\hbar} x^2 \right) \right)' = A x e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2} \left(\frac{kmx^2}{\hbar^2} - \frac{3\sqrt{km}}{\hbar} \right)$$

Уровни энергии осциллятора. Примеры решения задач о квантовом осцилляторе.

Получив все производные, подставим в уравнение Шредингера и найдем полную энергию E:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} A x e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2} \left(\frac{kmx^2}{\hbar^2} - \frac{3\sqrt{km}}{\hbar} \right) + \frac{kx^2}{2} A x e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2} = E A x e^{-\frac{\sqrt{mk}}{2\hbar} x^2}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{kmx^2}{\hbar^2} - \frac{3\sqrt{km}}{\hbar} \right) + \frac{kx^2}{2} = E$$

$$E = -\frac{kx^2}{2} + \frac{3\sqrt{km}}{2\hbar} + \frac{kx^2}{2}$$

$$E = \frac{3\sqrt{km}}{2\hbar} = \left| \omega^2 = \frac{k}{m} \right| = \frac{3}{2} \omega \hbar$$

Ответ: $E = \frac{3}{2} \omega \hbar$